

8

总12期

2026

全国地表水水质

NATIONAL SURFACE WATER QUALITY REPORT

月报

生态环境部监测司

中国环境监测总站

2026年9月

目 录

一、概 况	1
1 主要江河	1
2 重要湖库	3
二、主要江河	5
1 长江流域主要江河	5
2 黄河流域主要江河	5
3 珠江流域主要江河	6
4 松花江流域主要江河	7
5 淮河流域主要江河	9
6 海河流域主要江河	10
7 辽河流域主要江河	11
8 浙闽片主要江河	13
9 西北诸河主要江河	13
10 西南诸河主要江河	13
三、湖泊和水库	14
1 太湖	14
2 巢湖	14
3 滇池	14
4 重要湖泊	15
5 重要水库	15
附 录	19

一、概 况

2026年8月，全国地表水总体为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。其中：I类水质断面占4.2%，II类占42.5%，III类占27.2%，IV类占19.1%，V类占5.0%，劣V类占1.9%。与上月相比，水质无明显变化。




图 1-1 2026年8月全国地表水水质类别比例




图 1-2 2026年8月全国地表水超标指标统计

1 主要江河

本月全国主要江河总体水质良好。其中：I类水质断面占4.4%，II类占45.8%，III类占26.4%，IV类占16.9%，V类占4.6%，劣V类占1.9%。与上月相比，水质有所好转。




图 1-3 2026 年 8 月全国主要江河水质类别比例




图 1-4 2026 年 8 月全国主要江河超标指标统计

长江流域、西北诸河和西南诸河水质为优；黄河流域、珠江流域和浙闽片河流水质良好；松花江流域、淮河流域、海河流域和辽河流域为轻度污染。




图 1-5 2026 年 8 月十大流域主要江河水质类别比例

2 重要湖库

重要湖泊和水库中：I类水质湖库个数占 5.6%，II类占 31.2%，III类占 28.5%，IV类占 23.6%，V类占 8.3%，劣V类占 2.8%。与上月相比，水质无明显变化。




图 1-6 2026 年 8 月全国重要湖库水质类别比例




图 1-7 2026 年 8 月全国重要湖库超标指标统计

监测营养状态的湖库中：贫营养湖库占 2.0%，中营养占 43.9%，轻度富营养占 44.9%，中度富营养占 9.2%，无重度富营养湖库。




图 1-8 2026 年 8 月全国重要湖库营养状态比例

二、主要江河

1 长江流域主要江河

长江流域主要江河总体水质为优。其中Ⅰ类水质断面占4.4%，Ⅱ类占61.7%，Ⅲ类占24.3%，Ⅳ类占8.1%，Ⅴ类占1.3%，劣Ⅴ类占0.3%。与上月相比，水质有所好转。




图 2-1 长江流域主要江河水体超标指标统计

1.1 干流

长江干流水质为优。其中：Ⅰ类水质断面占6.5%，Ⅱ类占85.5%，Ⅲ类占8.1%，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类。与上月相比，水质无明显变化。

1.2 支流

长江水系主要支流水质良好。其中：Ⅰ类水质断面占4.2%，Ⅱ类占59.7%，Ⅲ类占25.7%，Ⅳ类占8.7%，Ⅴ类占1.4%，劣Ⅴ类占0.3%。与上月相比，水质无明显变化。

2 黄河流域主要江河

黄河流域主要江河总体水质良好。其中：Ⅰ类水质断面占4.0%，Ⅱ类占54.8%，Ⅲ类占25.2%，Ⅳ类占11.2%，Ⅴ类占2.8%，劣Ⅴ类占2.0%。与上月相比，水质无明显变化。




图2-2 黄河流域主要江河水体超标指标统计

2.1 干流

黄河干流水质为优。其中：I类水质断面占10.3%，II类占82.1%，III类占7.7%，无IV类、V类和劣V类。与上月相比，水质无明显变化。

2.2 支流

黄河水系主要支流水质良好。其中：I类水质断面占2.8%，II类占49.8%，III类占28.4%，IV类占13.3%，V类占3.3%，劣V类占2.4%。与上月相比，水质无明显变化。

3 珠江流域主要江河

珠江流域主要江河总体水质良好。其中：I类水质断面占5.9%，II类占54.6%，III类占25.0%，IV类占11.8%，V类占1.3%，劣V类占1.3%。与上月相比，水质无明显变化。




图 2-3 珠江流域主要江河水体超标指标统计

3.1 珠江水系

3.1.1 干流

珠江干流水质良好。其中：I类水质断面占 3.8%，II类占 63.5%，III类占 19.2%，IV类占 13.5%，无V类和劣V类。与上月相比，水质无明显变化。

3.1.2 支流

珠江水系主要支流水质为优。其中：I类水质断面占 10.3%，II类占 63.7%，III类占 16.4%，IV类占 6.2%，V类占 2.1%，劣V类占 1.4%。与上月相比，水质有所好转。

3.2 粤桂沿海诸河

粤桂沿海诸河水质良好。其中：I类水质断面占 1.4%，II类占 32.9%，III类占 41.1%，IV类占 24.7%，无V类和劣V类。与上月相比，水质有所好转。

3.3 海南诸河

海南诸河水质良好。其中：II类水质断面占 48.5%，III类占 36.4%，IV类占 6.1%，V类占 3.0%，劣V类占 6.1%，无I类。与上月相比，水质无明显变化。

4 松花江流域主要江河

松花江流域主要江河总体为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、氟化物、氨氮和五日生化需氧量。其中：II类水质断面占 8.4%，III类占 37.4%，IV类占 36.0%，V类占 14.8%，劣V类占 3.4%，无I类。与上月相比，水质有所好转。




图 2-4 松花江流域主要江河水体超标指标统计

4.1 松花江水系

4.1.1 干流

松花江干流为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数和溶解氧。其中：III类水质断面占 62.5%，IV类占 37.5%，无其他类。与上月相比，水质无明显变化。

4.1.2 支流

松花江水系主要支流为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷。其中：II类水质断面占 11.1%，III类占 41.3%，IV类占 38.1%，V类占 7.9%，劣V类占 1.6%，无I类。与上月相比，水质有所好转。

4.2 黑龙江水系

黑龙江水系为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数和化学需氧量。其中：III类水质断面占 12.5%，IV类占 28.1%，V类占 43.8%，劣V类占 15.6%，无I类和II类。与上月相比，水质无明显变化。

4.3 乌苏里江水系

乌苏里江水系为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷。其中：II类水质断面占 13.3%，III类占 33.3%，IV类占 40.0%，V类占 13.3%，无I类和劣V类。与上月相比，水质有所好转。

4.4 图们江水系

图们江水系为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、总磷、高锰酸盐指数和氨

氮。其中：II类水质断面占10.0%，III类占30.0%，IV类占40.0%，V类占20.0%，无I类和劣V类。与上月相比，水质无明显变化。

4.5 绥芬河水系

绥芬河水系为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数和化学需氧量。其中：小地营和道河断面为III类，城子后和三岔口断面为V类。与上月相比，小地营和道河断面水质有所好转，城子后和三岔口断面水质有所下降。

5 淮河流域主要江河

淮河流域主要江河总体为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、五日生化需氧量和氟化物。其中：I类水质断面占0.6%，II类占14.5%，III类占25.6%，IV类占42.6%，V类占12.3%，劣V类占4.4%。与上月相比，水质无明显变化。




图2-5 淮河流域主要江河水体超标指标统计

5.1 淮河水系

5.1.1 干流

淮河干流为轻度污染，主要超标指标为总磷、化学需氧量和溶解氧。其中：II类水质断面占15.4%，III类占38.5%，IV类占30.8%，V类占15.4%，无I类和劣V类。与上月相比，水质无明显变化。

5.1.2 支流

淮河水系主要支流为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷。其中：Ⅰ类水质断面占0.6%，Ⅱ类占15.3%，Ⅲ类占23.2%，Ⅳ类占44.6%，Ⅴ类占12.4%，劣Ⅴ类占4.0%。与上月相比，水质无明显变化。

5.2 沂沭泗水系

沂沭泗水系为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中：Ⅰ类水质断面占1.2%，Ⅱ类占11.8%，Ⅲ类占29.4%，Ⅳ类占42.4%，Ⅴ类占9.4%，劣Ⅴ类占5.9%。与上月相比，水质有所好转。

5.3 山东半岛独流入海

山东半岛独流入海河流为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中：Ⅱ类水质断面占16.7%，Ⅲ类占23.8%，Ⅳ类占38.1%，Ⅴ类占16.7%，劣Ⅴ类占4.8%，无Ⅰ类。与上月相比，水质无明显变化。

6 海河流域主要江河

海河流域主要江河总体为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷、五日生化需氧量和氨氮。其中：Ⅰ类水质断面占2.5%，Ⅱ类占26.3%，Ⅲ类占35.4%，Ⅳ类占24.7%，Ⅴ类占7.4%，劣Ⅴ类占3.7%。与上月相比，水质无明显变化。




图2-6 海河流域主要江河水体超标指标统计

6.1 海河水系

6.1.1 干流

海河干流为轻度污染，主要超标指标为溶解氧。其中，海津大桥断面为Ⅲ类，海河大闸断面为Ⅴ类，三岔口断面为劣Ⅴ类。与上月相比，海河大闸断面水质有所下降，三岔口和海津大桥断面水质无明显变化。

6.1.2 支流

海河水系主要支流为轻度污染，主要超标指标为总磷、化学需氧量和五日生化需氧量。其中：Ⅰ类水质断面占3.1%，Ⅱ类占27.0%，Ⅲ类占36.7%，Ⅳ类占23.5%，Ⅴ类占5.6%，劣Ⅴ类占4.1%。与上月相比，水质无明显变化。

6.2 滦河水系

滦河水系为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷。其中：Ⅱ类水质断面占43.8%，Ⅲ类占12.5%，Ⅳ类占37.5%，Ⅴ类占6.2%，无Ⅰ类和劣Ⅴ类。与上月相比，水质无明显变化。

6.3 冀东沿海诸河水系

冀东沿海诸河水系水质为优。其中：Ⅱ类水质断面占14.3%，Ⅲ类占85.7%，无其他类。与上月相比，水质无明显变化。

6.4 徒骇马颊河水系

徒骇马颊河水系为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中：Ⅱ类水质断面占14.3%，Ⅲ类占23.8%，Ⅳ类占38.1%，Ⅴ类占23.8%，无Ⅰ类和劣Ⅴ类。与上月相比，水质无明显变化。

7 辽河流域主要江河

辽河流域主要江河总体为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮和氟化物。其中：Ⅰ类水质断面占3.1%，Ⅱ类占43.1%，Ⅲ类占28.1%，Ⅳ类占16.2%，Ⅴ类占4.4%，劣Ⅴ类占5.0%。与上月相比，水质无明显变化。




图2-7 辽河流域主要江河水体超标指标统计

7.1 辽河水系

7.1.1 干流

辽河干流为中度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量和氟化物。其中：II类水质断面占28.6%，III类占21.4%，IV类占14.3%，V类占14.3%，劣V类占21.4%，无I类。与上月相比，水质有所下降。

7.1.2 支流

辽河水系主要支流为轻度污染，主要超标指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷。其中：II类水质断面占22.2%，III类占35.2%，IV类占25.9%，V类占9.3%，劣V类占7.4%，无I类。与上月相比，水质无明显变化。

7.2 大辽河水系

大辽河水系水质良好。其中：I类水质断面占5.7%，II类占51.4%，III类占25.7%，IV类占14.3%，劣V类占2.9%，无V类。与上月相比，水质有所好转。

7.3 大凌河水系

大凌河水系水质为优。其中：II类水质断面占76.9%，III类占23.1%，无其他类。与上月相比，水质无明显变化。

7.4 鸭绿江水系

鸭绿江水系水质为优。其中：I类水质断面占16.7%，II类占66.7%，III类占16.7%，无IV类、V类和劣V类。与上月相比，水质无明显变化。

7.5 辽东沿海诸河

辽东沿海诸河水质良好。其中：Ⅱ类水质断面占47.1%，Ⅲ类占35.3%，Ⅳ类占17.6%，无Ⅰ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类。与上月相比，水质无明显变化。

7.6 辽西沿海诸河

辽西沿海诸河水质良好。其中：Ⅱ类水质断面占55.6%，Ⅲ类占22.2%，Ⅳ类占22.2%，无Ⅰ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类。与上月相比，水质有所好转。

8 浙闽片主要江河

浙闽片主要江河总体水质良好。其中：Ⅰ类水质断面占2.9%，Ⅱ类占57.5%，Ⅲ类占29.3%，Ⅳ类占8.0%，Ⅴ类占2.3%，无劣Ⅴ类。与上月相比，水质有所下降。

9 西北诸河主要江河

西北诸河主要江河总体水质为优。其中：Ⅰ类水质断面占32.9%，Ⅱ类占52.1%，Ⅲ类占6.8%，Ⅳ类占5.5%，Ⅴ类占1.4%，劣Ⅴ类占1.4%。与上月相比，水质无明显变化。

10 西南诸河主要江河

西南诸河主要江河总体水质为优。其中：Ⅰ类水质断面占10.3%，Ⅱ类占72.2%，Ⅲ类占15.5%，Ⅳ类占1.0%，Ⅴ类占1.0%，无劣Ⅴ类。与上月相比，水质无明显变化。

三、湖泊和水库

1 太湖

1.1 湖体

太湖全湖整体为轻度污染，主要超标指标为总磷。其中，东部沿岸区水质为优，湖心区水质良好，北部沿岸区为轻度污染，西部沿岸区为中度污染。与上月相比，全湖整体、北部沿岸区和西部沿岸区水质有所下降，东部沿岸区水质有所好转，湖心区水质无明显变化。

营养状态评价表明：全湖整体和北部沿岸区均为轻度富营养。

1.2 环湖河流

主要环湖河流总体为轻度污染，主要超标指标为总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量和氨氮。其中：II类水质断面占12.7%，III类占34.9%，IV类占43.7%，V类占7.9%，劣V类占0.8%，无I类。与上月相比，水质无明显变化。

2 巢湖

2.1 湖体

巢湖全湖整体为轻度污染，主要超标指标为总磷。其中，东半湖为轻度污染，西半湖为中度污染。与上月相比，全湖整体和东半湖水质无明显变化，西半湖水质有所下降。

营养状态评价表明：全湖整体为轻度富营养。其中，西半湖为中度富营养，东半湖为轻度富营养。

2.2 环湖河流

主要环湖河流总体轻度污染。其中：II类水质断面占10.5%，III类占52.6%，IV类占31.6%，V类占5.3%，无I类和劣V类。与上月相比，水质明显好转。

3 滇池

3.1 湖体

滇池全湖整体为轻度污染，主要超标指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。其中，滇池外海和滇池草海水质均为轻度污染。与上月相比，全湖整体、滇池外海和

滇池草海水质均无明显变化。

营养状态评价表明：全湖整体为中度富营养。其中，滇池外海为中度富营养，滇池草海为轻度富营养。

3.2 环湖河流

主要环湖河流总体为轻度污染，主要超标指标为溶解氧。其中：Ⅲ类水质断面占25.0%，Ⅳ类占58.3%，Ⅴ类占8.3%，劣Ⅴ类占8.3%，无Ⅰ类和Ⅱ类。与上月相比，水质无明显变化。

4 重要湖泊

重要湖泊中，程海*、佩枯错*、乌伦古湖*和岱海*4个湖泊为劣Ⅴ类水质；斧头湖、镜泊湖、异龙湖*、星云湖、杞麓湖、元荡-淀山湖、四方湖、天井湖和高邮湖9个湖泊为Ⅴ类；南漪湖、大通湖、洪湖、鄱阳湖、龙感湖、东钱湖、查干湖*、莫莫格泡*、贝尔湖*、小兴凯湖、乌梁素海、沙湖、漏湖、西湖、南湖、巢湖、七里湖、女山湖、沱湖、洪泽湖、瓦埠湖、邵伯湖、高塘湖、克鲁克湖和色林错*25个湖泊为Ⅳ类；衡水湖、仙女湖、升金湖、梁子湖、武昌湖、泊湖、洞庭湖、石臼湖、草海、菜子湖、长湖、黄大湖、黄盖湖、东湖、兴凯湖、普莫雍错、洱海、阳宗海、长荡湖、阳澄湖、南四湖、城东湖、城西湖、焦岗湖、白马湖和赛里木湖26个湖泊为Ⅲ类；白洋淀、高唐湖、内外珠湖、红枫湖、邛海、扎陵湖、东平湖、万峰湖、骆马湖、博斯腾湖、班公错、青海湖和鄂陵湖13个湖泊为Ⅱ类；泸沽湖、抚仙湖和喀纳斯湖3个湖泊为Ⅰ类。

与上月相比，大通湖、莫莫格泡*、兴凯湖、骆马湖和色林错*水质明显好转；衡水湖、洞庭湖、草海、查干湖*、东平湖、星云湖、长荡湖、阳澄湖、城东湖、白马湖和青海湖水质有所好转；升金湖、斧头湖、菜子湖、鄱阳湖、镜泊湖、小兴凯湖、乌梁素海、洱海、西湖、四方湖、邵伯湖、高邮湖和赛里木湖水质有所下降；其余湖泊水质无明显变化。

5 重要水库

重要水库中，莲花水库、宿鸭湖水库和石梁河水库3个水库为Ⅴ类水质；于桥水库、尼尔基水库、松花湖、三门峡水库、大广坝水库、鹤地水库和燕山水库7个水库为Ⅳ类；大宁水库、官厅水库、洪门水库、白莲河水库、察尔森水库、磨盘山水库、小

浪底水库、小湾水库、云蒙湖、南湾水库、峡山水库、大伙房水库、石城子水库、蘑菇湖水库和青格达水库 15 个水库为Ⅲ类；密云水库、王庆坨水库、潘家口水库、丹江口水库、太平湖、富水水库、瀛湖、百花湖、花亭湖、隔河岩水库、鲁班水库、黄龙滩水库、东圳水库、千岛湖、里石门水库、长潭水库、陆浑水库、龙羊峡水库、茈碧湖、公明水库、清林径水库、铁岗水库、高州水库、松涛水库、沙河水库、董铺水库、白龟山水库、宫山嘴水库、桓仁水库、水丰湖、碧流河水库和雁栖湖 32 个水库为Ⅱ类；东江水库、柘林湖、漳河水库、岩滩水库和新丰江水库 5 个水库为Ⅰ类。

与上月相比，富水水库、峡山水库、宫山嘴水库、石城子水库和蘑菇湖水库水质有所好转；于桥水库、尼尔基水库、莲花水库、鹤地水库、南湾水库和宿鸭湖水库水质有所下降；其余水库水质无明显变化。




图 3-1 2026 年 8 月重要湖泊营养状态指数比较




图 3-2 2026 年 8 月重要水库营养状态指数比较

附录

1、地表水水质月报评价指标及标准

根据原环境保护部《关于印发<地表水环境质量评价办法（试行）>的通知》（环办〔2011〕22号）要求，地表水水质评价指标为《地表水环境质量标准（GB 3838—2002）》表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，即：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物。湖泊和水库营养状态评价指标为：叶绿素a（chl_a）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）和高锰酸盐指数（COD_{Mn}）共5项。

水质评价标准执行《地表水环境质量标准（GB 3838—2002）》，按I类~劣V类六个类别进行评价。化学需氧量达到或优于III类时不参与水质评价。

地表水水质湖泊和水库营养化评价方法按贫营养~重度富营养五个级别进行评价。

2、河流水质评价方法

（1）断面水质评价

河流断面水质类别评价采用单因子评价法，即根据评价时段内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定。描述断面的水质类别时，使用“符合”或“劣于”等词语。断面水质类别与水质定性评价分级的对应关系见表1。

表1 断面、河段水质定性评价

水质类别	水质状况	表征颜色	水质功能
I、II类水质	优	蓝色	饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等
III类水质	良好	绿色	饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区
IV类水质	轻度污染	黄色	一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水
V类水质	中度污染	橙色	农业用水及一般景观用水
劣V类水质	重度污染	红色	除调节局部气候外，使用功能较差

（2）河流、流域（水系）水质评价

河流、流域（水系）水质评价：当河流、流域（水系）的断面总数少于5个时，计算河流、流域（水系）所有断面各评价指标浓度算术平均值，然后按照“（1）断面水

质评价”方法评价，并按表1指出每个断面的水质类别和水质状况。

当河流、流域（水系）的断面总数在5个（含5个）以上时，采用断面水质类别比例法，即根据评价河流、流域（水系）中各水质类别的断面数占河流、流域（水系）所有评价断面总数的百分比来评价其水质状况。河流、流域（水系）的断面总数在5个（含5个）以上时不作平均水质类别的评价。如果所有断面水质均为Ⅲ类，整体水质为良好；如果所有断面水质均为Ⅴ类，整体水质为中度污染。

河流、流域（水系）水质类别比例与水质定性评价分级的对应关系见表2。

表2 河流、水系水质定性评价

水质类别比例	水质状况	表征颜色
I~Ⅲ类水质比例≥90%	优	蓝色
75%≤I~Ⅲ类水质比例<90%	良好	绿色
I~Ⅲ类水质比例<75%，且劣Ⅴ类比例<20%	轻度污染	黄色
I~Ⅲ类水质比例<75%，且20%≤劣Ⅴ类比例<40%	中度污染	橙色
I~Ⅲ类水质比例<60%，且劣Ⅴ类比例≥40%	重度污染	红色

（3）地表水主要污染指标的确定方法

a、断面主要污染指标的确定方法

评价时段内，断面水质为“优”或“良好”时，不评价主要污染指标。

断面水质超过Ⅲ类标准时，先按照不同指标对应水质类别的优劣，选择水质类别最差的前三项指标作为主要污染指标。当不同指标对应的水质类别相同时计算超标倍数，将超标指标按其超标倍数大小排列，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。当氰化物或汞、铅、六价铬等重金属超标时，也作为主要污染指标列出。

确定了主要污染指标的同时，应在指标后标注该指标浓度超过Ⅲ类水质标准的倍数，即超标倍数，如高锰酸盐指数(1.2)。对于水温、pH值和溶解氧等项目不计算超标倍数。

$$\text{超标倍数} = \frac{\text{某指标的浓度值} - \text{该指标的Ⅲ类水质标准}}{\text{该指标的Ⅲ类水质标准}}$$

b、河流、流域（水系）主要污染指标的确定方法

将水质超过Ⅲ类标准的指标按其断面超标率大小排列，整个流域取断面超标率最大的前五项为主要污染指标，河流水系取断面超标率最大的前三项为主要污染指标；

对于断面数少于5个的河流、流域（水系），按“a、断面主要污染指标的确定方法”确定每个断面的主要污染指标。

$$\text{断面超标率} = \frac{\text{某评价指标超过III类标准的断面(点位)个数}}{\text{断面(点位)总数}} \times 100\%$$

3、湖泊水库评价方法

(1) 水质评价

a、湖泊、水库单个点位的水质评价，按照“2（1）断面水质评价”方法进行。

b、当一个湖泊、水库有多个监测点位时，计算湖泊、水库多个点位各评价指标浓度算术平均值，然后按照“2（1）断面水质评价”方法评价。

c、湖泊、水库多次监测结果的水质评价，先按时间序列计算湖泊、水库各个点位各个评价指标浓度的算术平均值，再按空间序列计算湖泊、水库所有点位各个评价指标浓度的算术平均值，然后按照“2（1）断面水质评价”方法评价。

d、对于大型湖泊、水库，亦可分不同的湖（库）区进行水质评价。

e、河流型水库按照河流水质评价方法进行。

(2) 营养状态评价

a、评价方法

采用综合营养状态指数法（ $TLI(\Sigma)$ ）。

b、湖泊营养状态分级

采用0~100的一系列连续数字对湖泊（水库）营养状态进行分级：

$TLI(\Sigma) < 30$ 贫营养

$30 \leq TLI(\Sigma) \leq 50$ 中营养

$TLI(\Sigma) > 50$ 富营养

$50 < TLI(\Sigma) \leq 60$ 轻度富营养

$60 < TLI(\Sigma) \leq 70$ 中度富营养

$TLI(\Sigma) > 70$ 重度富营养

c、综合营养状态指数计算

综合营养状态指数计算公式如下：

$$TLI(\Sigma) = \sum_{j=1}^m W_j \cdot TLI(j)$$

式中： $TLI(\Sigma)$ ——综合营养状态指数；

W_j ——第 j 种参数的营养状态指数的相关权重；

$TLI(j)$ ——代表第 j 种参数的营养状态指数。

以chl_a作为基准参数，则第 j 种参数的归一化的相关权重计算公式为：

$$W_j = \frac{r_{ij}^2}{\sum_{j=1}^m r_{ij}^2}$$

式中： r_{ij} ——第 j 种参数与基准参数chl_a的相关系数；

m ——评价参数的个数。

中国湖泊（水库）的chl_a与其它参数之间的相关关系 r_{ij} 及 r_{ij}^2 见表3。

表3 中国湖泊（水库）部分参数与chl_a的相关关系 r_{ij} 及 r_{ij}^2 值

参数	chl _a	TP	TN	SD	COD _{Mn}
r_{ij}	1	0.84	0.82	-0.83	0.83
r_{ij}^2	1	0.7056	0.6724	0.6889	0.6889

（4）各项目营养状态指数计算

$$TLI(\text{chl}_a) = 10 (2.5 + 1.086 \ln \text{chl}_a)$$

$$TLI(\text{TP}) = 10 (9.436 + 1.624 \ln \text{TP})$$

$$TLI(\text{TN}) = 10 (5.453 + 1.694 \ln \text{TN})$$

$$TLI(\text{SD}) = 10 (5.118 - 1.94 \ln \text{SD})$$

$$TLI(\text{COD}_{\text{Mn}}) = 10 (0.109 + 2.661 \ln \text{COD}_{\text{Mn}})$$

式中：chl_a单位为mg/m³，SD单位为m；其它指标单位均为mg/L。

4、不同时段水环境变化的判断

对断面（点位）、河流、流域（水系）、全国及行政区域内不同时段的水质变化趋

势分析，以断面（点位）的水质类别或河流、流域（水系）、全国及行政区域内水质类别比例的变化为依据，对照表1或表2的规定，按下述方法评价。

按水质状况等级变化评价：

- ①当水质状况等级不变时，则评价为无明显变化；
- ②当水质状况等级发生一级变化时，则评价为有所变化（好转或变差、下降）；
- ③当水质状况等级发生两级以上（含两级）变化时，则评价为明显变化（好转或变差、下降、恶化）。

按组合类别比例法评价：

设 ΔG 为后时段与前时段I~Ⅲ类水质百分点之差： $\Delta G=G_2-G_1$ ， ΔD 为后时段与前时段劣V类水质百分点之差： $\Delta D=D_2-D_1$ ；

- ①当 $\Delta G-\Delta D>0$ 时，水质变好；当 $\Delta G-\Delta D<0$ 时，水质变差；
- ②当 $|\Delta G-\Delta D|\leq 10$ 时，则评价为无明显变化；
- ③当 $10<|\Delta G-\Delta D|\leq 20$ 时，则评价有所变化（好转或变差、下降）；
- ④当 $|\Delta G-\Delta D|>20$ 时，则评价为明显变化（好转或变差、下降、恶化）。

按水质状况等级变化评价或按组合类别比例变化评价两种方法的评价结果一致，可采用任何一种方法进行评价；若评价结果不一致，以变化大的作为变化趋势评价的结果。